



## DETECCIÓN DE EYACULACIÓN RETRÓGRADA

### PREPARACIÓN DEL PACIENTE

- Para esta prueba diagnóstica el paciente deberá abstenerse de la eyaculación (masturbación o sexo) durante un mínimo de 2 días y un máximo de 3 días antes de la recolección de la orina, que se hará luego de una eyaculación.
- El día anterior a su entrevista en el Fertility & IVF Center of Miami deberá comenzar a tomar pastillas de bicarbonato por vía oral cada 6 horas.

***Por favor, siga este horario:***

- 06 hs: Tome una pastilla de bicarbonato de sodio (650 mg) por vía oral.
- 12 hs: Tome una pastilla de bicarbonato de sodio (650 mg) por vía oral.
- 18 hs: Tome una pastilla de bicarbonato de sodio (650 mg) por vía oral.
- 24 hs: Tome una pastilla de bicarbonato de sodio (650 mg) por vía oral.
- 06 hs: Tome una pastilla de bicarbonato de sodio (650 mg) por vía oral.

### EL DÍA DE SU CITA EN EL FERTILITY & IVF CENTER OF MIAMI

Para realizar este procedimiento deberá orinar aproximadamente 1 hora antes de su cita. Siga los siguientes pasos:

1. Primero, deberá masturbarse y recoger una muestra de semen en un frasco estéril provisto por el Centro.
2. Luego, deberá orinar en otro frasco estéril.
3. Entregar ambas muestras en el laboratorio.